

LOMBER SPİNAL MR İNCELEMESİ;

Lomber lordoz düzleşmiştir. İntervertebral eklem aralık genişlikleri tabiidir. Vertebra korpus yükseklikleri korunmuştur.

Disklerde dejenerasyona bağlı T2 sekanslarda sinyal kaybı mevcuttur.

Vertebralarda ılımlı spondilotik değişiklikler izlenmiştir.

L3-4 seviyesinde faset artropatiye bağlı minimal psödo anterolisteazis ve sağ ağırlıklı geniş tabanlı bulging ile sağ foraminal protrüzyon ve sağ epinöral yağ planlarında obliterasyon izlenmiştir. Sağ kök basılanmıştır. Spinal kanalda orta düzeyli darlık oluşmuştur.

L4-5 seviyesinde faset artropatiye bağlı minimal psödo anterolisteazis ve geniş tabanlı bulging ile spinal kanalda ılımlı darlık oluşmuştur.

L5-S1 seviyesinde geniş tabanlı diffüz bulging ve tekal keseye kısmi indentasyon izlenmiştir.

Diğer disk arka konturlarında kanal yönüne anlamlı taşma saptanmamıştır.

Nöral foramen genişlikleri tabii olup, nöral kökler serbesttir.

İncelenen düzeylerde spinal kanal AP çapları fizyolojik sınırlardadır.

Spinal kord normal yerinde konus medüllaris olarak sonlanmaktadır. Kauda equina köklerinin dağılımları simetrik ve tabidir.

Paravertebral yumuşak dokular doğal görünümündedir.